

GONADOTROPİN İLE OVÜLASYON İNDÜKSİYONU SONRASI ON HAFTALIK BİR GEBEDE TEKRARLAYAN OVER TORSİYONU

O Özkaya, M Sezik, H Şahiner, R Desdicioğlu, F Demir, **H Kaya**

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta

İnfertil çiftlerin tedavisinde ovülasyon indüksiyonu sık kullanılan bir yöntemdir, fakat gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu sonrası gelişen çok sayıda follikül veya lütein kistler nedeniyle overler büyüyüp torsiyone olabilmektedir. Torsiyon vakaları reproduktif dönemde ve ovülasyon indüksiyonu alan infertil hastalarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda overlerin korunması için erken tanı çok önem kazanmaktadır. Biz gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu sonrasında 10 haftalık bir gebe kadında onbeş gün arayla meydana gelen tekrarlayıcı over torsiyonu vakasını ve bunun tedavisinde uygulanan laparoskopik cerrahi sunduk. Hastanın kliniğimizde laparoskopik tedavisinden 15 gün önce yine over torsiyonu nedeniyle laparoskopik detorsiyon yapılma öyküsü vardı. Hastaya gebelik ve tekrarlayan over torsiyonu tanısı ile laparoskopi uygulandı. Laparoskopide uterusun 2-2,5 aylık gebelik cesametinde olduğu, sol overin iri olmakla beraber normal görünümde bulunduğu, sağ overin ise iri ve mor renkte görüldüğü, ligamentum suspensorium aksında 2 kez kendi etrafında torsiyone olduğu saptandı. Douglasta ve batın içinde serbest sıvı izlendi. Sağ over detorsiyone edildi ve takiben normal kan akımının olmasına bağlı renginde düzelme saptandı. Sağ ligamentum overi-proprium kendi üzerinde suture edilerek kısaltıldı. Mezoovarium bölgesi ile sağ batın yan duvarı arasına ikinci bir suture koyularak over yerinde sabitlendi. Operasyon sonrasında klinik bulgular geriledi ve gebeliğin takibine devam edildi. Özellikle infertilite nedeniyle ovülasyon indüksiyonu alan ve overleri hiperstimüle olmuş vakalarda torsiyon açısından yakın takip gerekmektedir. Torsiyon olan vakalarda laparoskopik detorsiyon güvenilirdir, ama tekrar aynı over veya karşı overde torsiyon riski olmasından dolayı ilk operasyonda mümkün olduğu kadar overi sabitleyici sutureler koyulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Ovaryan hiperstimülasyon, Gebelik, Over torsiyonu

drhakankaya2002@yahoo.com

ADOLESAN GEBELİKLERDE PROGNOZ: ÜNİVERSİTE DENEYİMİ

Y Üstün, Y Engin Üstün, M Meydanlı, R Atmaca, A Kafkaslı

İnönü Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Malatya

Amaç: Ülkemizde adolesan gebeliklere sıkça rastlanılmakta ve hem psikososyal açıdan hem de anne-çocuk sorunları açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmadaki amacımız adolesan gebeliklerin maternal ve perinatal sonuçlarını tespit ederek bu gebeliklere en uygun yaklaşımın verilmesini sağlamaktır.

Materyal-Metot: 2001 ile aralık 2004 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapmış 3351 hasta, obstetrik açıdan değerlendirildi. Çalışma popülasyonu 19 yaş ve altı ile 19 yaş üstü kadınlar olarak iki gruba ayrıldı.

Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 3235 (% 96.5) kadın 19 yaş üstü iken, 116 (% 3.5) kadın 19 yaş ve altı idi. Hastaların okur-yazarlık oranı farklılık göstermemekteydi. Gebelik komplikasyonlarından preeklampsi ve antenatal kanamanın gruplar arasında farklılık göstermediği saptandı. Preterm eylem adolesan grupta istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek bulundu ($p=0.001$). Doğum şekli açısından karşılaştırıldığında, adolesan grupta normal doğum oranlarının daha yüksek olduğu görüldü ($p=0.001$). Doğum ağırlığı ve beşinci dakika Apgar skorlarının adolesan grupta, diğer gruba oranla anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (sırasıyla $p=0.001$ ve $p=0.021$).

Tartışma: Perinatal sonuçların iyileştirilmesi için adolesanlara kontrasepsiyon, erken yaş evlilikleri ve antenatal takip ile ilgili planlı programlı çok ciddi eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: adolesan gebelik, maternal sonuçlar, neonatal sonuçlar.

ustuny@hotmail.com