

HASEKİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİNDE 2002-2004 YILLARI ARASINDA YAPILAN SEZARYEN OPERASYONLARININ DEMOGRAFİK İNCELENMESİ

F. Ş. Kara, C Dane, B Dane, M Kıray, A Çetin, M Yayla

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Amaç: Kliniğimizde iki yıllık sürede yapılan sezaryen operasyonlarının demografik verilerinin incelenmesi.

Yöntem: Kasım 2002 ile Ekim 2004 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan 679 vakadan dosyalarına ulaşılan 520 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Kliniğimizde 2002 Kasım-Aralık 'da 231, 2003'de 1080 ve 2004 Ekim ayı sonuna kadar 1347 doğum gerçekleştirildi. Bu dönem içinde ortalama sezaryen hızı % 25.4'dür. Anne yaş ortalaması 28 ± 5.76 olarak bulundu. Onbeş ile 20 yaş arasında % 8 ve 35 yaş üzerinde % 11 bulundu. Vakaların % 23 'ü nullipar, %38 primipar, 2-4 doğum yapanların oranı % 32 ve 5 ve beşden fazla doğum yapanların oranı % 4 idi. Gebelerin % 18'inde akraba evliliği bulunuyordu. Vakaların % 50 si hiç sezaryen geçirmemiş, % 41'i bir kez, % 8'i iki kez ve üç tanesi de üç kez sezaryen geçirmişti. Gebelerin % 36.1'inde gebelikte geçirilmiş en sık hastalık olarak % 8.2 ile hipertansif hastalıklar görüldü. Vakaların yaklaşık yarısında ilk sırada eski sezaryen endikasyonu, ikinci sırada prezantasyon anomalileri, üçüncü sırada fetal distres saptandı. Bebeklerin % 8' i 2500 g altında iken, %10'u 4000 g üzerinde saptandı. Bebeklerin % 54'ü erkek bebek olarak doğdu. Vakaların % 93'üne genel, % 5'ine spinal ve % 2'sine epidural anestezi uygulandı. Sezaryene alınan hastaların % 21'i anemik olarak saptandı. Ayrıca vakaların % 28'ine laparotomi sırasında tüp ligasyonu yapılmıştır.

Sonuç: Gebelerde rastlanan en sık sistemik hastalık hipertansif hastalıklar olarak görüldü. Sezaryen endikasyonları içinde eski sezaryen önde gelmektedir. Bu vakalarda uygun koşullarda vajinal doğum denenmesi sezaryen oranının düşürülmesine yol açabilir. Ayrıca sezaryen sırasında fertilitenin sone erdirilmesi % 28 gibi yüksek orandadır.

cemdane@yahoo.com

HASEKİ HASTANESİ DOĞUM KLİNİĞİNDE SEZARYENİ İZLEYEN OPERATİF VE POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR

C Dane, F. Ş. Kara, B Dane, M Erginbaş, M Kıray, M Yayla

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Amaç: Sezaryen operasyonlarında görülen komplikasyonları saptamak.

Yöntem: İki yıllık sürede gerçekleştirilen 679 sezaryen vakasının intraoperatif komplikasyonlar (uterin rüptür, mesane yaralanması ve uterin atoni) ve postoperatif komplikasyonlar (endometritis, ciltaltı enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, tromboflebit) yönünden ayrıntılı olarak incelenmesi.

Bulgular: Vakaların % 4.5 komplikasyon saptandı. Bunların yedisi postpartum yara enfeksiyonu, üçü akciğer enfeksiyonu ve üçü peroperatif mesane yaralanması şeklindeydi. İki vakada uterin atoni saptanmıştır. Parametrial kanama, re-laparotomi, kalp yetmezliği, multi organ yetmezliği, böbrek yetmezliği birer vakada saptanmıştır. Sezaryen histerektomi plasenta previa ve plasenta accrete vakalarına uygulanmıştır.

Sonuç: Sonuçlarımız literatür ile uyumlu çıkmıştır. Postoperatif komplikasyonların az görülmesinin nedeni mutlaka profilaktik antibiyotik kullanılması, erken mobilizasyon ve üriner kateterizasyonun 5-6 saat ile sınırlandırılması olabilir.

cemdane@yahoo.com