

DÜZELTME

İntrakardiyak Hiperekomenik Odağın Türk Populasyonunda Down Sendromu Belirteci Olarak Kullanımı

Fehmi Yazıcıoğlu, O.Nuri Özyurt, Özlem Dülger, Atilla Çankaya, Mehmet Aygün, Reyhan Demirbaş

Süleymaniye Doğumevi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(4): 163-167 e-Adres: <http://www.perinataldergi.com/20040124001>

Derginizde yayınlanan “İntrakardiyak hiperekomenik odağın Türk populasyonunda Down sendromu belirteci olarak kullanımı” (Perinatoloji Dergisi Cilt:12, Sayı: 4/Aralık 2004, 163-167) başlıklı makalemizin 1 numaralı tablosunda sağ alt gözde hiperekomenik odağı olmayan trisomi 21 negatif olguların sayısı verilmesi gerekirken, trisomi 21 i olmayan ancak hiperekomenik odağı pozitif olguların sayıları dahil edilmiştir. Doğru rakamlar ve bunlar eşliğinde düzeltilmiş istatistik çıktıları aşağıda verilmiştir.

Kaynaklar

1. Yazıcıoğlu FH, Özyurt ON, Dülger Ö, Çankaya A, Aygün M, Demirbaş R. İntrakardiyak Hiperekomenik Odağın Türk Populasyonunda Down Sendromu Belirteci Olarak Kullanımı. Perinatoloji Dergisi 2004 12(4): 163-7

Tablo 1. Hiperekomenik odakla (HO) birlikte soft marker (SM) saptandığında Trisomi 21 için Odds Ratio (OR) (olasılık oranı).

	T 21 +	T 21 -	χ^2	OR (%5-95 GA)	p
HO + / SM +	2	15			
HO -	7	5674			
Toplam	9	5689	145.65	108.07 (20.73-563.41)	<0.0001

HO +/SM +: Hem hiperekomenik odak hem de herhangi bir soft marker mevcut
HO -: Hiperekomenik odak mevcut değil
 χ^2 : Ki kare
OR (%5-95 GA) : Odds ratio ve % 5-95 güvenlilik aralığı