

75**GEBELİKTE PORTAL VEN TROMBOZU VE TROMBOFİLİA****Elif Gül Yapar, Ümit Bilge, Turan Çağlar, Tayfun Vural, Hüseyin Dumanlı, Oya Gökmen
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi-Ankara**

Gebelikte tromboembolik olaylar anne morbiditesinde artışa yol açarken fetal-maternal mortalite potansiyeli de yaratır. Tromboembolik olaylar açısından bazı doğuştan gelen ya da edinisel durumlar risk artışa yol açar. Risk artışı trombofilia olarak adlandırılır. Trombofilia taramasında antitrombin III eksikliği, protein C eksikliği, protein S eksikliği, anormal fibrinojen, homosistinüri, kardiolipin, lupus-antikoagülan sendromu, faktör V (Leiden) mutasyonu araştırılmalıdır; ancak bu tetkiklerin gebe olarak başvuran hastalarda yapılması belirsizliklere yol açabilir.

Venöz tromboembolik olaylar içerisinde portal ven trombozu ve sekonder gelişen ekstra hepatik portal hipertansiyon 1993-1996 yılları arasında portal ven trombozu + hipersplenizm, gebelikte protein C ve S eksikliği ile izlenen bir hastada ve sonraki döneminde de yenidoğanda takip, gelişen komplikasyonlar ve tedavi sunulmaktadır.

76**İKİZ GEBELİKLERDE KONJENİTAL ANOMALİLER VE PERİNATAL MORTALİTE ORANLARI****Elif Gül Yapar, Mehmet Can Aslanca, Turan Çağlar, Ümit Bilge, Erhan Şenses, Oya Gökmen
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi-Ankara**

Giriş: Konjenital malformasyon ve perinatal mortalite oranları ikiz gebeliklerde tekiz gebeliklere oranla yüksek olarak bildirilmektedir.

Yöntem: 1993-1995 yılları arasında doğum salonu ve Yüksek Riskli Gebelik bilgisayar kayıtları, hasta dosyaları, ultrasonografi ve genetik laboratuvarı ve ölü defterlerinden retrospektif olarak 22. gebelik haftasından büyük ya da 500g üzerindeki tekiz ve ikiz yenidoğanların taranması şeklinde yapıldı.

Bulgular: Toplam 47.301 doğumda 438 (0.93%) ikiz gebelik mevcuttu. Toplam 443 konjenital malformasyon saptandı. 438 ikiz gebeliğin 21'inde (7 nöral tüp defekti, 3 hidrosefali, 2 konjenital kalp hastalığı, 2 gastrointestinal sistem anomali, 3 Twin-reversed arterial perfusion sequence (TRAP), bir yapışık ikiz, 5 stuck twin, 5 tek-umbilikal arter saptandı. Malformasyona hiç bir oğuda ikiz eşlerinde aynı zamanda rastlanmadı. Tek gebeliklerde konjenital malformasyon oranı %0.9 iken, ikiz gebeliklerde %4.7 olarak bulundu. Perinatal mortalite tekiz gebeliklerde %1.3, ikiz gebeliklerde %9.3 idi.

Sonuç: İkiz gebeliklerde özellikle nöral tüp defektlerine bağlı konjenital anomali sıklığı ve perinatal mortalite tek gebeliklerden anlamlı olarak yüksektir.