

TERMDEKİ İKİZ GEBELİKLERDE SEZARYEN DOĞUMLA İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Baha Oral¹

Mehmet Güney²

Demir Özbaşar³

¹ Yrd.Doç.Dr. SDÜ. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ISPARTA

² Uzman Dr. Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ISPARTA

³ Prof.Dr. SDÜ. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Bşk. ISPARTA

Yazışma Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 32040 ISPARTA

Tel: 0246-2326657

Fax: 0246-2185344

E-Mail: bahao@hotmail.com

ABSTRAKT

AMAÇ: Çalışmanın amacı travayda bulunan termdeki ikiz gebeliklerde sezaryen doğuma ilişkin risk faktörlerini değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: İkiz gebeliğe sahip travaydaki 102 kadına ait veriler prospektif olarak toplandı. Sezaryen ile doğum yapan kadınlar vaginal doğum yapanlarla karşılaştırıldı. Sezaryen ile ilişkili en önemli faktörleri belirlemek amacıyla multipl lojistik regresyon analizi uygulandı.

BULGULAR: 102 hastanın 20'si (%19.6) sezaryenle, 82'si (%80.4) vaginal yoldan doğum yaptı. Univariat analize göre sezaryenle doğum yapanlar daha fazla oranda nullipariteye, girişte ve epidural anestezi sırasında doğum için daha az elverişli bir servikse, daha yüksek oksitosin infüzyon oranlarına sahiptiler ve konvülziyon profilaksisi amacıyla magnezyum tedavisi almaktaydılar.

SONUÇ: Çalışmamız, ikiz gebeliklerde nulliparların sezaryen açısından daha fazla bir riske sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, epidural anestezi ve uygulama zamanı ile sezaryen doğumlar arasında önemli ve bağımsız bir ilişki saptadık.

ANAHTAR KELİMELE: İkiz gebelikler, sezaryen doğum, epidural anestezi, servikal muayene.